

# LES ANTICOAGULANTS

(Médicaments Antiplaquettaires)

**ASA Kératinisé 81 mg  
(Aspirin®)**

**Ticagrelor 90 mg  
(Brilinta®)**

*Les anticoagulants (médicaments antiplaquettaires) réduisent le risque d'avoir une autre crise cardiaque. Ils préviennent la formation de caillots dans les artères du cœur, ce qui est particulièrement important si vous avez une endoprothèse dans une artère ou plus. Vous devrez prendre l'ASA (Aspirin®) et le ticagrelor (Brilinta®) après la pose d'endoprothèses. Il est important de prendre ces médicaments suivant l'ordonnance à la lettre. ASSUREZ-VOUS DE REMPLIR VOS ORDONNANCES POUR L'ASA (Aspirin®) ET LE TICAGRELOR (Brilinta®) en quittant l'hôpital. NE CESSEZ JAMAIS de prendre ces médicaments sans d'abord en parler avec le cardiologue, même si un autre professionnel de la santé vous dit d'arrêter.*

1. Il faut prendre l'ASA (Aspirin®) UNE FOIS par jour et le ticagrelor (Brilinta®) DEUX FOIS par jour. Prenez-les chaque jour à la même heure, une heure qui vous convient. Il est très important de ne pas manquer de dose, surtout si vous avez une endoprothèse ou plus. Une dose manquée peut augmenter le risque de formation de caillots dans l'endoprothèse, ce qui peut causer une autre crise cardiaque. Si vous manquez une dose, prenez-la dès que vous y pensez à moins qu'il soit presque l'heure de la dose suivante. NE PRENEZ PAS plus de médicament pour compenser la dose manquée. Pendant que vous prenez le ticagrelor (Brilinta®), ne prenez pas plus d'ASA (Aspirin®) que la dose prescrite.
2. Il n'est pas nécessaire de prendre ces médicaments avec de la nourriture, mais certaines personnes trouvent que l'ASA (Aspirin®) est mieux toléré avec la nourriture puisqu'il peut irriter l'estomac.



Winnipeg Regional  
Health Authority  
Caring for Health

Office régional de la  
santé de Winnipeg  
À l'écoute de notre santé



3. L'ASA (Aspirin®) et le ticagrelor (Brilinta®) peuvent augmenter le risque de saignements. Si vous vous coupez ou si vous avez un saignement de nez, mettez-y de la pression pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Appelez immédiatement votre fournisseur de soins de santé si vous avez l'un des effets secondaires suivants :

- Maux d'estomac intenses
- Vomi sanglant ou qui ressemble au café moulu
- Selles ou urine sanglantes, selles noires et goudronneuses
- Saignements ou ecchymoses inhabituels ou excessifs

Les effets secondaires moins graves incluent un mal d'estomac, une tendance aux ecchymoses et des brûlures d'estomac (reflux d'acide). Si ces effets secondaires vous causent des problèmes, discutez-en avec le pharmacien ou un autre fournisseur de soins de santé.

4. Certaines personnes qui prennent le ticagrelor (Brilinta®) éprouvent parfois l'essoufflement. Tant que la sensation n'est pas très grave et qu'elle disparaît quelques minutes plus tard, cela est normal. Si cet effet secondaire vous

cause des problèmes, discutez-en avec le pharmacien ou un autre fournisseur de soins de santé.

5. Certains médicaments, y compris ceux en vente libre et ceux à base d'herbes médicinales, contiennent des substances anticoagulantes ou interagissent avec l'ASA (Aspirin®) ou le ticagrelor (Brilinta®). Il est important de ne pas prendre d'autres anticoagulants à part ceux prescrits par votre fournisseur de soins de santé, car cela augmentera le risque de saignements. Consultez le pharmacien ou un autre fournisseur de soins de santé avant de commencer à prendre un nouveau médicament. Si vous devez prendre un médicament antidouleur en vente libre, l'acétaminophène (Tylenol®) est le choix le plus sûr.
6. Assurez-vous que tous vos médecins, dentistes ou autres fournisseurs de soins de santé savent que vous prenez ces médicaments. Vous devrez peut-être cesser de les prendre avant de subir certaines chirurgies ou interventions dentaires. Consultez d'abord votre cardiologue avant de cesser de prendre ces médicaments.

---

***N.B. : Ces renseignements ne sont pas destinés à couvrir tous les usages, précautions, interactions ou effets négatifs possibles de ces médicaments. Consultez le pharmacien d'hôpital ou communautaire pour obtenir plus d'information et les réponses à vos questions.***



Winnipeg Regional  
Health Authority  
Caring for Health

Office régional de la  
santé de Winnipeg  
À l'écoute de notre santé

