

DIGOXIN

(LANOXIN[®], TOLOXIN[®])

Digoxin is used to help you feel better if your heart muscle is weak, or slow down your heart rate (pulse) if you have an irregular heartbeat (atrial fibrillation, sometimes called “A-fib”).

1. This medication is taken ONCE daily. Take it exactly as you are told by your pharmacist or other healthcare provider. Try to take it at the same time each day. If you miss a dose, take it as soon as you remember unless it is more than half way to the next dose. DO NOT ‘double-up’ your next dose or take extra medication to make up for the missed dose.
2. Digoxin may be taken with or without food. Take it with food if you develop upset stomach. Try to avoid eating lots of fibre or taking antacids within 2 hours of taking digoxin.
3. You may need to have blood levels of digoxin checked by your healthcare provider. Blood levels will show if you are being given the right dose. When blood levels are taken, they should be done before you take your dose that day, or at least 8 hours after you took your dose.
4. Signs that you have too much digoxin in your body may include:
 - Nausea, vomiting, or diarrhea
 - A heart rate (pulse) that feels very slow or very fast
 - Unusual or increasing drowsiness, confusion, or dizziness
 - Blurred vision
 - Seeing things as yellow or green, seeing ‘halos’ around objects or lights

Contact your healthcare provider or go to the nearest Emergency Department if you experience these side effects.

Other side effects (if bothersome, contact your healthcare provider):

- Upset stomach
 - Headache
 - Mild diarrhea
 - Mild dizziness
5. Many medications and natural health products can affect the way this medication works. Always check with your pharmacist or other healthcare provider before starting or stopping any medication.

NOTE: This information is not intended to cover all possible uses, precautions, interactions, or adverse effects for these medications. Talk to your hospital or community pharmacist for more information or if you have any questions.



Winnipeg Regional
Health Authority
Caring for Health

Office régional de la
santé de Winnipeg
À l'écoute de notre santé



CARDIAC
SCIENCES MANITOBA
SCIENCES CARDIAQUES
MANITOBA

DIGOXINE

(LANOXIN[®], TOLOXIN[®])

La digoxine est utilisée pour vous aider à mieux vous sentir si votre cœur est affaibli, ou pour ralentir votre fréquence cardiaque (pouls) si vous avez des battements cardiaques irréguliers (fibrillation auriculaire).

1. Ce médicament est pris UNE FOIS par jour.
Prenez-le exactement selon les directives de votre pharmacien ou d'un autre prestataire de soins. Prenez ce médicament à la même heure chaque jour. Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous y pensez, sauf s'il s'est écoulé plus de la moitié du temps jusqu'à la dose suivante. NE prenez PAS de dose en double ou des doses supplémentaires pour compenser la dose oubliée.
 2. La digoxine peut être prise avec ou sans nourriture. Prenez-la avec de la nourriture si vous éprouvez des maux d'estomac. Essayez d'éviter de manger beaucoup de fibres ou de prendre des antiacides dans les 2 heures précédant ou suivant la prise de digoxine.
 3. Il se pourrait que votre médecin doive vérifier vos taux sanguins de digoxine. Vos taux sanguins indiqueront si vous recevez la bonne dose. La mesure de vos taux sanguins doit être effectuée avant que vous ayez pris votre dose de la journée ou au moins 8 heures après la prise de votre dose de la journée.
 4. Les signes que vous avez trop de digoxine dans votre sang peuvent inclure :
 - Nausées, vomissements ou diarrhée
 - Fréquence cardiaque (pouls) qui semble très lente ou très rapide
 - Somnolence, confusion ou étourdissements inhabituels ou croissants
 - Vision floue
 - Vision en jaune ou en vert, « halos » autour des objets ou des lumières
- Si vous éprouvez ces effets secondaires, contactez votre prestataire de soins ou rendez vous au service des urgences de l'hôpital le plus proche.*
- Autres effets secondaires (s'ils vous incommode, consultez votre prestataire de soins) :
- Maux d'estomac
 - Maux de tête
 - Diarrhée légère
 - Étourdissements légers
5. De nombreux médicaments et produits de santé naturels peuvent modifier la façon dont ce médicament agit. Consultez toujours votre pharmacien ou autre prestataire de soins avant de prendre ou d'arrêter tout médicament.

REMARQUE : Cette information ne vise pas à couvrir tous les usages, toutes les précautions, interactions et réactions indésirables possibles de ces médicaments. Pour toute information additionnelle ou toute question, consultez le pharmacien de l'hôpital ou communautaire.



Winnipeg Regional
Health Authority
Caring for Health

Office régional de la
santé de Winnipeg
À l'écoute de notre santé



CARDIAC
SCIENCES MANITOBA
SCIENCES CARDIAQUES
MANITOBA