

HYDRALAZINE

(APRESOLINE®)

Hydralazine opens your blood vessels. This lowers your blood pressure and makes it easier for your heart to pump blood if your heart muscle is weak (heart failure).

1. This medication is usually taken THREE or FOUR times daily, spaced out evenly throughout the day. Take it exactly as you have been told by your pharmacist or other healthcare provider. If you miss a dose, take it as soon as you remember unless it is almost time for your next dose. DO NOT take extra medication to make up for the missed dose.
2. Hydralazine can be taken with or without food. If hydralazine upsets your stomach, take it with food.
3. This medication will lower your blood pressure. If you feel dizzy or light-headed and feel like you might pass out, sit or lie down right away. To lower your risk of feeling dizzy or falling:
 - Walk slowly up and down stairs
 - Change your body position slowly, especially when standing up
 - Dangle your feet over the edge of the bed before getting out of bed
4. There are some rare side effects of hydralazine that your pharmacist or other healthcare provider should know about. Talk to your pharmacist or other healthcare provider if you have any of the following:
 - Numbness, burning, or tingling of the hands or feet
 - Heartbeat that feels faster than normal or does not feel normal
 - Chest pressure or chest pain
5. Talk to your healthcare provider if you develop fever, rash, joint pain, joint swelling, or unexplained sore muscles, as these may be signs of a rare, serious reaction.
6. Some medications, including over-the-counter and herbal medications, may interact with hydralazine. Check with your pharmacist or other healthcare provider before starting any new medication.

Tell your healthcare provider if dizziness is a problem for you and have your blood pressure checked. Avoid driving until you know how this medication affects you.

Other side effects (if bothersome, contact your healthcare provider):

- Nausea, vomiting, diarrhea, or loss of appetite
- Headache

NOTE: This information is not intended to cover all possible uses, precautions, interactions, or adverse effects for these medications. Talk to your hospital or community pharmacist for more information or if you have any questions.



Winnipeg Regional
Health Authority
Caring for Health

Office régional de la
santé de Winnipeg
À l'écoute de notre santé



CARDIAC
SCIENCES MANITOBA
SCIENCES CARDIAQUES
MANITOBA

HYDRALAZINE (APRESOLINE®)

L'hydralazine dilate les vaisseaux sanguins. Elle réduit votre tension artérielle et aide votre cœur à pomper le sang si votre muscle cardiaque est faible (insuffisance cardiaque).

1. Ce médicament est habituellement pris TROIS ou QUATRE fois par jour, à des intervalles également espacés durant la journée. Prenez-le exactement selon les directives de votre pharmacien ou d'un autre prestataire de soins. Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous y pensez, sauf si c'est presque le moment de la dose suivante. N'essayez PAS de compenser une dose oubliée en prenant une double dose.
2. L'hydralazine peut être prise avec ou sans nourriture. Prenez-la avec de la nourriture si vous éprouvez des maux d'estomac.
3. Ce médicament diminue la tension artérielle. Si vous vous sentez étourdi ou avez des vertiges et que vous sentez que vous allez perdre conscience, assoyez-vous ou allongez-vous immédiatement. Pour réduire votre risque de vous sentir étourdi ou de tomber :
 - Montez et descendez lentement les escaliers
 - Changez de position lentement, particulièrement lorsque vous vous levez
 - Restez assis sur le bord du lit avant de vous lever

Informez votre prestataire de soins si vous souffrez d'étourdissements pour qu'il vérifie votre tension artérielle. Évitez de conduire avant de connaître les effets de ce médicament sur vous.
4. L'hydralazine peut occasionner de rares effets secondaires dont votre pharmacien ou autre prestataire de soins devrait être informé. Informez votre pharmacien ou autre prestataire de soins si vous présentez l'un des effets secondaires suivants :
 - Nausée, vomissements, diarrhée ou perte d'appétit
 - Maux de tête
5. L'hydralazine peut occasionner de rares effets secondaires dont votre pharmacien ou autre prestataire de soins devrait être informé. Informez votre pharmacien ou autre prestataire de soins si vous présentez l'un des effets secondaires suivants :
 - Engourdissement, picotements ou brûlure au niveau des mains et des pieds
 - Battements de cœur qui semblent plus rapides que la normale ou qui semblent anormaux
 - Pression ou douleur à la poitrine
6. Informez votre médecin si vous développez une fièvre, une éruption cutanée, une douleur ou une enflure articulaire, ou encore des douleurs musculaires inexplicables, car elles peuvent être un signe d'une réaction médicamenteuse grave, mais rare.
7. Certains médicaments, y compris les médicaments en vente libre et les remèdes à base de plantes médicinales, peuvent interagir avec l'hydralazine. Consultez votre pharmacien ou autre prestataire de soins avant de prendre tout nouveau médicament.

REMARQUE : Cette information ne vise pas à couvrir tous les usages, toutes les précautions, interactions et réactions indésirables possibles de ces médicaments. Pour toute information additionnelle ou toute question, consultez le pharmacien de l'hôpital ou communautaire.



Winnipeg Regional
Health Authority
Caring for Health

Office régional de la
santé de Winnipeg
À l'écoute de notre santé



CARDIAC
SCIENCES MANITOBA
SCIENCES CARDIAQUES
MANITOBA